



# سنڌ روول سپورت آرگنائیزیشن



## ڪڻ جو فصل

هن وقت دنيا آباديء جي وڌندڙ دباء جو شڪار آهي، جنهن ڪري ماظهو اناج ۽ پاڻي جي سخت اٺاه مان گذرري رهيا آهن. کاڻ خوراڪ جي اهميت کي نظر ۾ رکندي ڪڻ جي فصل کي نظرانداز نتو ڪري سگهجي. پاڪستان جي 18 ڪروڙ آبادي آهي. ۽ 22 لک ميٽرك ٿن ڪڻ هر سال

پئدا ٿئي ٿي، سا ملڪي ضروريات کي بمشڪل منهن ڏي ٿي ۽ ڪڻهن ڪڻهن بلجنڌڙ موسم ۽ آبهوا جي زد ۾ اچي پئداواري هدف پورو ن ٿو ٿي سگهي. ان ڪري هن فصل کي نهايت ئي اهميت حاصل آهي. جنهن تي ن صرف انسان پر جانور، پکي پکن، چوبائي مال جو به گذارو آهي. هي واحد فصل آهي جيڪو دنيا ۾ هر روز ڪٿي ن ڪٿي پوکيو وڃي ٿو.

هن مان بسڪيت، سوجي، سيون، دبل روتي ڪيڪ وغيره به نهن ٿا، جنهن مان ڪڻ جي اهميت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

**زمين جي تياري:** ڪڻ جي بهتر پئداوار حاصل ڪرن لاءِ چيڪي لتناسي، وارياسي لتناسي ۽ زرخيز زمين جي چونڊ ڪٿي وڃي. ڪلراڻي ۽ پکي زمين ۾ فصل سٺو ڪونه ٿو ٿئي ۽ ٻوٽي جي پاڙ يا ته سڙي وڃي ٿي يا واڻ ويجهه ڪونه ٿي ڪري سگهي. زمين کي به کان ٿي اوونها هر ڏنا وڃن، بعد ۾ پٽر پيچڻ لاءِ سانهر يا ڪيڻ گھمانائي وڃي. جيڪڻهن ليزر ليولر آهي ته ان جو استعمال ڪارائتو ۽ لاپائتو ٿيندو. زمين ۾ وٿان جو ڀان في ايڪر 50 گاڏا پوکيء، کان هڪ مهينو اڳ ملايا وجن ته زمين جي زرخيزي لاءِ بهتر ٿيندو.

**پوکيء جو وقت:** هي اناج وارو اهم ربيع جو فصل ڪري ليڪيو وڃي ٿو، جيڪو دنيا ۾ وڌ ۾ وڌ ايراضي تي پوکجندڙ فصل آهي. سنڌ ۾ هن جي پوکائي جنسون جي لحاظ کان ٿئي ٿي. آڳائيون جنسون پھرئين نومبر کان ۽ پاچائيون جنسون 20 نومبر کان 25 دسمبر تائين پوکيون وجن ٿيون.

بع جو انتخاب ۽ مقدار: بهتر فصل لاءِ ٻج کي وڌيڪ اهميت حاصل آهي، ”ٻج هجي ته نج هجي“ 50-60 ڪلوگرام تصديق شده ٻج في ايڪر وجھن گهرجي.

**ڪڻ جون جنسون:** سرسٻز، ٿي ڊي 1 انقلاب 91، عبدالستار، ڪرن 95، ماروي، سوغات، مهران، انمول، پئائي، مومن، ٿي جي 83، بكر آڳائيون جنسون ۽ جڏهن ته ٿي جي 83، ڪرن، انمول، انقلاب، بكر پاچائيون جنسون سڏجن ٿيون.

**پوکيء جو طريقو:** پئداوار جي لحاظ کان نازري راڻي آهي ۽ چت ٻانهئي چئجي ٿي. نازري واري طريقو بهتر ۽ لاپائتو آهي، هن ۾ قطارن جو فاصلو 9 انچن تي رکبو آهي ۽ ٻج کي ڏيڍي انچ جي اونهائي تي آتوميڪ درل وسيلي رکيو ويندو آهي. ڪٿي ڪٿي پاڻي ۽ ٻج چت کيڙ يالٽ به ڪن ٿا. جنهن ۾ گندگاه صاف ڪرن ناممڪن ٿيو پوي ۽ في ايڪر ٻج جوبه وڌيڪ استعمال ٿي وڃي ٿو.

**كيمائي ٻان جو استعمال:** زمين جي چڪاس مطابق ٻان جو استعمال ڪجي يا وري نائزروجن ۽ فاسفورس وارا ٻان 2:1 جي تناسب سان ڏجن. جنهن جو وچور هن ريت آهي.

ٻه ٻوريون يوريا ۽ سوا هڪ ٻوري يوريا ۽ اڌائي ٻوريون نائتروفاس يا اڌائي ٻوريون يوريا ۽ سوا هڪ ٻوري تي. ايس.پي يا اڌائي ٻوريون امونيم سلفيت ۽ اڌائي ٻوريون نائتروفاس، يا ٻه ٻوريون امونيم نائترويت ۽ اڌائي ٻوريون نائتروفاس.

**گندگاه جو خاتمو:** گندگاه فصل جي خوراڪ، هوا ۽ پاشي هر ڀاڳي پائيوار آهي. ان ڪري گندگاه جي خاتمي کي تمام گھطي اهميت حاصل آهي. ان لاءِ ڪيميائي چونڊيل دوائون به اچن ٿيون. جن جو زمين تي اسپري ڪرڻ سان گاه سڀيو وڃي ۽ ڪٺڪ جي فصل کي نقصان ڪونه ٿئي ٿو. مثلاً آسوپروتان، برموكسل ايم.سي.پي گروب جي هنن مان ڪابه هڪ دوا اسپري ڪرڻ سان ڪٺڪ جا گندگاه جهڙوڪ، نازو، جهل، سنجھ، بصرى، جنگل، جو، ٻٺڪ، جهنجي پالڪ ڪانڊيري وغيره سڀيو ناس ٿي وڃن ۽ فصل وڌي ٿيڻ تائين اسرن ٿي ڪون.

**ڪٺڪ مان گاه ڪين لاءِ بارهiero Bar Harrow** (ڪلين واروتيا) گھمائجي جيڪو پھرئين پاڻي کان پوکي وقت اچن وقت استعمال ٿيندو آهي.

آپاڻي: هن فصل لاءِ 5-6 پاشي گھربل هوندا آهن. پاڻي نه صرف انسان جي زندگي لاءِ ضروري آهي. پر هر فصل لاءِ آب حيات پڻ آهي. پھريون پاڻي پوكائي جي 20-25 ڏينهن بعد ۽ ٻيو پاڻي ڪٺڪ جو فصل جڏهن سلا يا ڪڙيون ڪڍي، ٿيون پاڻي ٻوڙي ٻڌن وقت، چوٿون پاڻي سنگن يا ڏڍي دوران، ۽ پنجون پاڻي داڻن هر كير اچن وقت ڏيڻ سائنسي طريقو آهي. اهي سڀ مرحلا سئي پئداوار لاءِ اهر آهن.

**جيٽ ۽ بيماريون:** ڪٺڪ هر ڪو خاص جيٽ حملو ڪوند ڪندو آهي، پر موسمي تبديلين جي ڪري ڪڏهن ڪڏهن تيلي جو گدر (Stem fly) يا مهلو حملو ڪندو آهي. آمريڪن ڪيئون، گلابي سندوي ورلي نظر اچي سگهي ٿي. يا وري اڏوهي جو حملو وارياسي زمين ۾ ٿيندو آهي. اهو حملو Economic Threshold Level کان گهٽ هوندو آهي. ان ڪري ڪابه دوا اسپري نه ڪئي ويندي آهي. بيماريون هر رتي ۽ ڪانگياري اهر آهن، تن جو سيد ٿريتمينت ڏريعي تدارك ڪري سگهجي ٿو. پر سي به ايتريون عام ڪونهن. نارنگي يا پنن جي رتي به ڪئي ڪئي ڏئي وئي آهي. ڪٺڪ هر زنك جي گهٽائي فصل جي ڦيرگهير نه ڪرڻ جي ڪري نظر اچي رهي آهي. هن فصل تي ڪونه به حملو ڪن ٿا، انهن جي ٻرن هر فاستاڪسن گوريون وجهي ٻڙ آلي متى سان بند ڪري ڇڏجن.

**لابارو:** ڪٺڪ هر لابارو سنگ پچي وڃن ته ڪرڻ گھرجي، ورنه چاٿو ٿيڻ فصل ڪرڻ يا هوائين ڪري پئداوار کي ڏڪ رستدو. اڪثر لابارو اپريل ۽ مئي مهينن هر شروع ٿي ويندو آهي. ٻار يا ديرا ناهي ٿريشر وسيلي اناج صاف ڪيو وڃي. فصل جو بهه مال جي کائڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. سئي پئداوار 50-60 منڻ في ايڪڙ لهي ٿي. دنيا هر هائبرڊ جنسون هرسال تيار ٿين ٿيون. جن جي في ايڪڙ پئداوار 100-150 منڻ آهي. اهي جنسون اسان وقت ڪونه ٿيون ٺاهيون وڃن.

**ڏخирه:** ڪٺڪ جي صفائي کانپو، ان کي سئي هند تي ڏخiro ڪجي.

