

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گر



چيائيندڙ:

مانيسٽرنگ ايوبلشن ۽ ريسرچ يونٽ

سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن، هيڊ آفيس سکر. فون: 071-5631525



ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گر

ترتيب

ڊاڪٽر غلام رسول سميجو

نظر ثاني

نثار احمد پناڻ

ڪتاب جو نالو: ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گر

ترتيب: ڊاڪٽر غلام رسول سميجو

نظر ثاني: نثار احمد پناڻ

چاپو: پهريون

تعداد: 1000

لي آئوٽ ۽ ڪمپوزنگ: بخت علي ابڙو

چيائيندڙ: مانينٽرنگ ايوبيليشن ۽ ريسرچ يونٽ

ايڊريس: سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن

فون: 071-5633516 - 5631625

فيڪس: 071-5631791

وي سائيٽ: www.srso.org.pk

Name of Book: **KUKRIOON Paly KAMAIN JA GUR**

Author: Dr. Ghulam Rasool Samejo

Reviewed by: Nisar Ahmed Pathan

Edition: First

Quantity: 1000

Layout Composing: Bakhat Ali Abro

Publisher: Monitoring Evaluation & Research Unit

Address: Sindh Rural Support Organization

Sindhi Muslim Housing Society Sukkur

Phone # 071-5633516 – 5331625

Fax:# 071-5631791

Website www.srso.org.pk



شعبه قدرتي وسيلن جي انتظامڪاري

سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن

سکر

ستاء

1. ڪڪڙين جي پالنا 9
2. ڪڪڙ جو گوشت بهترين غذا 11
3. بيضا بطور غذا 12
4. ڪڪڙيون پالڻ 14
5. ڪڪڙين جو پاڻ 15
6. بيضا ڏيندڙ ڪڪڙيون 16
7. بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين جي لاءِ جاءِ ڏيڻ جو انتخاب 18
8. ڪڪڙين مان وڌيڪ بيضا حاصل ڪرڻ 21
9. بيضا 22
10. عمدہ بيضن جي سجاڻپ 23
11. بيضن جي حفاظت 24
12. بيضن جو وڪرو 27
13. بيضن تي هوا، گهم ۽ گرمي جي درجي جا اثر 28
14. چوزا ڪيڻ لاءِ بيضن جي چونڊ 29
15. آري لاءِ ڪڪڙين جي چونڊ 30
16. ڪڪڙين جون بيماريون 34
17. ڪڪڙين ۾ خراب عادتون 39
18. مصري ڪڪڙيون 45
19. ڪڪڙيون جي پالنا جو ڪئلينڊر 51
20. زهري زباني 64
21. سُمَل جي سياڻپ 66

ارپنا

هي ننڍڙي ڪاوش ارپيان ٿو ان هستي کي جنهن جي شفقت
اڻ مئي ملي ۽ ملندي رهندي امان سانئڻ جي نانءُ

په اکر

ڪڪڙين پالڻ جي ڪرت سوين سالن کان پهراڙين توڙي شهرن ۾ ڪئي پيئي وڃي پر گهٽ ڄاڻ، فني اڻ ڄاڻائي ۽ ڪڪڙين جي سٺي نسل جي گهٽتائي جي ڪري دلپسند ۽ نفعو ڏيندڙ ڪاروبار خاص ڪري ڳوٺاڻن کي ڪو خاطر خواه فائدو ڏيئي نه سگهيو آهي. جنهن جو هڪڙو سبب هي به آهي ته اسان وٽ پهراڙين ۾ ڳوٺاڻيون عورتون ڪڪڙيون ته پالي ٿيون وٺن پر انهن کي صحيح ڄاڻ يا سکيا نه هجڻ ڪري نقصان ٿو برداشت ڪرڻو پوي جيڪڏهن ڪڪڙيون جديد سائنسي طريقي سان پاليون وڃن پوءِ چون اهڙي گهر جي سطح تي ننڍي پيماني تي هجي گهٽ سيڙپ تي ڪمائي ڏيندڙ صفا سولي ڪرت آهي.

سرسو ڪڪڙيون پالڻ متعلق ڳوٺاڻن کي معلومات پهچائڻ لاءِ هڪ ڪتاب جي ضرورت محسوس ڪندي هي ڪوشش ڪئي، جيڪا هيٺ توهان جي هٿن ۾ آهي جيئن عام ڳوٺاڻا مرد چاهي عورتون ڪڪڙيون پالڻ کي هڪ ڪمائي ڏيندڙ ڪرت سمجهي ڏنڻو ڪن.

سونو ڪنگههراڻي

سرسو سکر.

ٿورا...

آئون انهن سمورن ساٿين جو ٿورائتو آهيان جن هي ڪتاب ترتيب ڏيڻ ۾ مدد ڪئي، خاص ڪري ڊاڪٽر سونو ڪنگههراڻي جو، جن جي رهنمائي ۽ فني مشورن سان هي ڪتاب ترتيب ڏنو ويو.

غ - ر - سميجو

پنهنجي پاران

هن ڌرتي جي گولي تي صدين کان هر جيو پنهنجي جيئدان لاءِ وٽ ۽ وس آهر اڻڳڻيا گر ڳوليندو رهيو آهي. انهي ڳولا ۾ انسان پنهنجي آمدني جا ذريعا ڳوليندو ويو ۽ انهي جا گس، گهيڙ ۽ گر ڳوليندو، تبديل ڪندو ۽ ان ۾ نواڻ پيدا ڪندو رهيو آهي.

انهي سموري جستجو ۾ وڌ ۾ وڌ اها ڪوشش رهي آهي ته نوان ڪمائي جا ذريعا ڳولي اسان طريقي سان آمدني ۾ اضافو ڪيو وڃي جيئن ته اسان جو ملڪ زرعي هجڻ ڪري ڳوٺن يا پهراڙين جي ماڻهن جي آمدني ڪيتي يا مالداري سان منسلڪ رهي آهي. گهريلو سطح تي چوپايي مال جي پالنا سان گڏ پڪين جي پالنا خاص ڪري مختلف نسلن جون ڪڪڙيون پالڻ پسنديده پيشو رهيو آهي. سرسو گهڻي عرصي کان اهو پئي محسوس ڪيو ته ڳوٺاڻن خاص ڪري عورتن جي آمدني ۾ اضافي لاءِ ڪڪڙيون پالڻ هڪ اهڙي سرگرمي آهي جنهن مان گهٽ سيڙپ ۽ ٿوري وقت ۾ سٺو ٺاڻو ڪمائي سگهجي ٿو.

هن سرگرمي شروع ڪرڻ کان پوءِ اسان کي اهو به محسوس ٿيو ته ڳوٺاڻن کي ڪڪڙيون پالڻ متعلق ڄاڻ ڏيڻ ضروري آهي. ان جي پورائي لاءِ هي ڪتاب توهان جي هٿن ۾ آهي. هن ڪتاب ۾ ڪڪڙين جي پالنا گهريلو سطح تي جديد سائنسي بنيادن تي ڪرڻ جا ڳڙ ڏنل آهن. ٻيو ته سٺي نسل جي ڪڪڙين متعلق ڄاڻ کي پڻ شامل ڪيو ويو آهي. آخر ۾ ڪجهه مثالي ڪهاڻيون پڻ ڏنل آهن ته جيئن ڳوٺاڻن کي پروڙ پوي ته ڪڪڙيون پالڻ ڪهڙي نه سستي ۽ سولي ڪرت آهي. جنهن مان چڱو خاصو آمدني ۾ اضافو ڪري سگهجي ٿو. سرسو کي وڌيڪ توهان جي سٺين صلاحن جو انتظار رهندو.

ڊاڪٽر غلام رسول سميجو

پيغام

وطن عزيز جي آباديءَ جو 70% سيڪڙو پهراڙي ۾ رهي ٿو. جنهن جو گذر سفر زراعت ۽ مال موڻشي تي آهي. پراڻي وقت کان اڄ ڏينهن تائين پهراڙي جا غريب ماروٽا مينهن، ڳئون، ري، بڪري سان گڏوگڏ ڪڪڙيون ضرور رکندا هيا ۽ جڏهن به ڪو دل گهريو مهمان ايندو هيو ته سندس تواضع ڪڪڙ جي پوڙ سان ڪندي خوشي ۾ ڪونه سمائبا هيا. ڪڪڙين جو پالڻ هن جديد دؤر ۾ انڊسٽري جو درجو ته ضرور رکي ٿو، پر پهراڙيءَ جي غريب، اڻوڃهه، مسڪين ماروٽن ۽ خصوصاً عورتن لاءِ گذر سفر جي ذريعي جو درجو پڻ رکي ٿو.

نئين دور ۾ ڪڪڙين جا نوان نسل روشناس ڪرايا ويا آهن، جنهن جي نه صرف گوشت جي پيداوار زياده آهي. پر اهي روزانه آنا به ڏين ٿيون، انهن جي پالڻ سان غريب عورتن جي روزمره ڪجهه نه ڪجهه آمدني ٿئي ٿي، ان ڪرت ۽ شوق جي ذريعي هو پنهنجو هٿ ٻين جي آڏو ڪونه ڦهلائين ٿيون ۽ آساني سان سندن گذر سفر پڻ ٿيو وڃي.

سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن، ان ڏس ۾ غريب عورتن کي خودڪفيل ڪرڻ خاطر ڪڪڙين جا يونٽ ورهائيندي، انهن جي متعلق معلومات ڏيڻ جو جيڪو عزم ڪيو آهي، تنهن کي آئون ساراهيان ٿو ۽ مون ئي اين.آر.ايم. شعبي جي عملي سان ملاقات دوران اهڙي صلاح ڏني هئي.

اميد ٿي ڪجي ته اسان جي هيءَ ننڍڙي ڪوشش پهراڙين ۾ رهندڙ عورتن لاءِ ترقيءَ جو هڪ روشن ڪرڻو ثابت ٿيندو.

فضل الله قريشي

وائيس چيئرمين

سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن سکر.

ڪڪڙين جي پالنا

هزارين سال اڳ گهرن ۾ خوبصورت رنگ برنگي ۽ مختلف نسلن جون ڪڪڙيون پالڻ جو شوق هلندو پيو اچي. ڪڪڙيون هڪ ته خوبصورت لاءِ پاليون وينديون هيون. ٻيو ته ان جي پيداوار کي خوراڪ ۾ استعمال ڪندا هئا. جيئن جيئن زمانو گذرندو ويو ۽ انساني ضرورتن ۾ اضافو ٿيندو ويو ۽ هي شوق هڪ نفعو ڏيندڙ ڪاروبار جي حيثيت اختيار ڪري ويو. هاڻي هر گهر ۾ وڌيڪ ڪڪڙيون پالڻ جي جستجو وڌي رهي آهي. پر ان ۾ ڪاميابي ان وقت ممڪن هوندي جڏهن ڪڪڙين کي مناسب طريقي سان پاليو وڃي. جيڪڏهن گهر ۾ ڇهه ڪڪڙيون رکيو وڃن ته روزانو استعمال لاءِ بيضا حاصل ڪري سگهجن ٿا ۽ گڏوگڏ جيڪي ڪڪڙيون بيضا ڏيڻ جي قابل نه رهن انهن کي ضرورت جي وقت ذبح ڪري بطور گوشت جي استعمال ڪري سگهجي ٿو. مطلب ته معمولي محنت سان اسان جي بيضن ۽ گوشت جي ضرورت پوري ٿي سگهي ٿي.

گهريلو ۽ ننڍي پيماني تي پالڻ جي لاءِ هن وقت اهڙيون ڪڪڙيون موجود آهن جن مان گهٽ ۾ گهٽ سال ۾ 150

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گُر

کان وٺي 200 ٽائين بيضا حاصل ڪري سگهجن ٿا. انهن جي لاءِ وڌيڪ جاءِ جي ضرورت به نه هوندي آهي. بلڪ ان جي پالڻ سان گهريلو آمدني ۾ سٺو اضافو ڪري سگهجي ٿو.

ڪڪڙيون ٻن مقصدن لاءِ پاليون وڃن ٿيون:

1. بيضا پيدا ڪرڻ لاءِ

2. گوشت پيدا ڪرڻ لاءِ

شهرن ۾ ٻنهي قسمن جون ڪڪڙيون پالي سگهجن ٿيون. پر ٻهراڙي ۾ جيڪڏهن فقط بيضا پيدا ڪرڻ واريون ڪڪڙيون پاليون وڃن ته وڌيڪ بهتر آهي. چوٽه گوشت وارين ڪڪڙين جو وڪرو ڪرڻ هڪ وڏو مسئلو آهي. جيڪڏهن ڳوٺن ۾ بجلي، پاڻي ۽ آمدورفت جي ذريعن جون سهولتون ميسر هجن ته گوشت پيدا ڪرڻ واريون ڪڪڙيون به پالي سگهجن ٿيون.

ننڍي پيماني يا وڏي ڪاروبار لاءِ ڪڪڙيون پالڻ لاءِ هيٺين ڳالهين جو خاص طور تي خيال رکڻ گهرجي:

1. اعليٰ ۽ معياري نسل جون ڪڪڙيون پاليون وڃن.

2. متوازن ۽ جهجهي مقدار ۾ خوراڪ مهيا ڪئي وڃي.

3. جاءِ جي مناسب چونڊ ۽ کڏي (پولٽري شيڊ) جي بناوت

تي خاص ڌيان ڏنو وڃي.

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گُر

ڪڪڙين جو گوشت بهترين غذا

ابتدا کان ئي گوشت انسان جي من پائيندڙ غذا رهيو آهي. ۽ ان جي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان جهنگلي جانورن ۽ پکين جو شڪار ڪندو رهيو آهي. اڄ جي دور ۾ جتي گوشت جا اگه وڌي ويا آهن ته به گوشت هر ماڻهو جي گهرج آهي. گوشت انسان کي نه صرف لذت مهيا ڪري ٿو بلڪ هي ان جي جسم جون غذائي ضرورتون پوريون ڪندي، نشونما به ڪري ٿو.

هن ۾ لمحيات يعني پروٽين جو وڏو مقدار ملي ٿو، جيڪو جسماني نشونما جي لاءِ ضروري آهي.

اسان جي معاشري ۾ ڪڪڙين جو گوشت سڀ کان اعليٰ ۽ لذت تصور ڪيو وڃي ٿو. چاڪاڻ ته هي نرم لذت ۽ ريشي کان سواءِ هوندو آهي. سولائي سان هضم ٿيڻ جي ڪري ٻار، پوڙها، بيمار ۽ حامله عورتون انهي کي آساني سان کائي سگهن ٿيون. انسان ۾ بيمارين خلاف قوت ملافت پيدا ڪري ٿو.

بيضا بطور غذا

گوشت کان سواءِ اسان کي ڪڪڙين مان بيضا حاصل ٿين ٿا جيڪي پروٽين جو بي پناهه زخيرو آهن. بيضن ۾ گوشت ۽ پاڇين جي پيٽ وڌيڪ ڪئلوئريز ملن ٿيون. ڪئلوئريز ۽ پروٽين خاص طور تي وڌندڙ ٻارن جي لاءِ بيحد ضروري آهن. گوشت ۽ بيضا حاصل ڪرڻ جي لاءِ اڄ ڪلھ ماضي جي پيٽ ۾ وڌيڪ ڪڪڙيون پاليون پيون وڃن.

اڄ جي ترقي يافته دور ۾ ڪڪڙيون نه رڳو گوشت ۽ بيضا حاصل ڪرڻ جي لاءِ پاليون وڃن ٿيون. پر انهن کي



جيتوڻيڪ ڪڪڙيون پالڻ جو رواج پنهنجي روايتي انداز ۾ ايشيائي ملڪن ۾ سالن کان هلندو پيو اچي. تاريخ جي ورقن کي اٽلائيندي معلوم ٿئي ٿو ته حضرت سليمان جي دسترخوان تي تريل ڪڪڙيون رکيون وينديون هيون. بيضن جي خاطر پالڻ لاءِ هميشه سٺي نسل جي ڪڪڙين جو انتخاب ڪيو وڃي ته جيئن ان مان وڌيڪ فائدو حاصل ڪري سگهجي.

ڪڪڙيون پالڻ



14

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ

وڪڻي پنهنجي آمدني ۾ خاطر خواه اضافو به ڪري سگهجي ٿو. ٻاهرين ملڪن ۾ ته هي صنعت وسيع پيماني تي هلائي وڃي ٿي.



تاريخ ٻڌائي ٿي ته ڪڪڙيون پالڻ جو درس سڀ کان پهريون چين جي بادشاهه نوشي پنهنجي رعيت کي قبل مسيح ۾ ڏنو هو.

13

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ

تہ پولتري (ڪڪڙين) جو پاڻ ڀاڄين جي لاءِ ڪيڏو اڪسير آهي. پولتري (ڪڪڙين) مان حاصل ڪيل پاڻ ۾ ٻين پاڻن جي نسبت خوراڪ جا جزا وڌيڪ مقدار ۾ ملن ٿا. ٻين جانورن جي پيٽ ۾ ڪڪڙين جي پاڻ ۾ نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽاش جو وڌيڪ مقدار پڻ ملي ٿو. ان کانسواءِ چوزن جي اندرئين نرم پرن سان وهائڻ، ڪشن وغيره به تيار ڪيا وڃن ٿا. ٻاهرين ملڪن ۾ پرن جا وهائڻا ۽ رضايون بيحد مهانگي اگهه ۾ وڪرو ٿين ٿيون.

بيضا ڏيندڙ ڪڪڙيون

عام طور تي بهراڙي ۾ ڪڪڙيون بيضن لاءِ پاليون وڃن ٿيون. هي حقيقت آهي ته بهترين ماحول ۾ پليل اعليٰ نسل جون ڪڪڙيون عام ديسي ڪڪڙين جي (پيٽ) ۾ وڌيڪ بيضا ڏين ٿيون. اسان وٽ روايتي نموني سان پلجندڙ ڪڪڙيون سال ۾ پنجاهه کان سٺ بيضا ڏين ٿيون. جڏهن ته اعليٰ نسل جون ڪڪڙيون سال ۾ ٻه سو ڏهه کان به سئو پنجاهه تائين بيضا ڏين ٿيون.

ديسي ڪڪڙين ۽ اعليٰ نسل جي ڪڪڙين ۾ جيڪڏهن مقابلو ڪيو وڃي ته توهان ڏسندا ته نه رڳو انهن مان بيضا

ڪڪڙيون پالڻ هڪ سولو، سستو ۽ گهريلو ڪاروبار آهي. ڪڪڙين کي سستي ۽ رهيل سهيل پر متوازن خوراڪ تي پالي بيضن ۽ گوشت جهڙي اعليٰ قسم جي غذا حاصل ڪري سگهجي ٿي. عام طور تي پائونڊ وڙني برائيلر (گوشت جي لاءِ پالڻ وارو چوزو) اڍائي ڪلو گرام خوراڪ کائي ڇهن کان ستن هفتن ۾ تيار ٿيندو آهي. گوشت جي استعمال سان انساني جسم ۾ پروٽين جي گهٽتائي پوري ڪري سگهجي ٿي. بيضا ڏيڻ واريون ڪڪڙيون معمولي موڙيءَ سان شهرن، ڳوٺن ۽ ٻنين ۾ (آساني) سولائي سان پالي سگهجن ٿيون. جيڪڏهن صحيح بنيادن تي شروع ڪيو وڃي ته هي هڪ نفعو ڏيندڙ ڪاروبار آهي.

ڪڪڙين جو پاڻ

ڪڪڙيون اسان جي باغيچن ۽ ڀاڄي جي فارمن جي لاءِ عمدي قسم جو پاڻ به مهيا ڪن ٿيون. هڪ اندازي جي مطابق 20 ويهه کن پڪي هڪ سال ۾ ايترو پاڻ مهيا ڪن ٿا. جيڪو هڪ بيگ مڪئي يا ٻه ڪئنال ڀاڄي جي پوک لاءِ ڪافي هوندو آهي. هڪ چارٽ وسيلي توهان سمجهي ويندا

حاصل ٿين ٿا بلڪه:

1. ديسي ڪڪڙين جي پيٽ ۾ اعليٰ نسل جون ڪڪڙيون جلدي بلوغت تي پهچن ٿيون.
2. ديسي ڪڪڙيون تقريبا ساڍا ڇهن مهينن جي عمر ۾ بيضا ڏيڻ شروع ڪن ٿيون.
3. ديسي ڪڪڙيون جلد ڪڙڪ هونديون آهن.
4. سني نسل جون ڪڪڙيون ڪڙڪ نه هونديون آهن.
5. پيٽ نرم ۽ وڌيل هوندو آهي.
6. تنگن جو رنگ اڇو ٿي وڃي ٿو.

اڄڪلهه سرڪاري پولٽري فارمن کان ڪيتريون ئي سني نسل جون بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين جا چوزا خريد ڪري سگهجن ٿا.

هي چوزا اٺن هفتن جا هوندا آهن ۽ انهن کي هڪ ٽن ۽ پنج مادين جو يونٽ ٺاهي وڪرو ڪيو وڃي ٿو. اٺن هفتن جي عمر ۾ چوزا انهي ڪري وڪرو ڪيا وڃن ٿا، ڇاڪاڻ ته ڳوٺن ۾ ننڍن چوزن کي هٿرادو گرمي پهچائڻ ۽ ابتدائي ٿڪا لڳائڻ ۾ تڪليف نه ٿئي.

گهرن ۾ پالڻ لاءِ اڪثر بيضا ڏيڻ واريون جوان ڪڪڙيون به خريد ڪيون آهن يا پاليل ڪڪڙين مان اهڙيون ڪڪڙيون چانتي ڪرڻيون پونديون آهن، جيڪي بيضا

گهٽ يا بلڪل نه ڏينديون آهن. ان لاءِ بيضا ڏيڻ واري سني ڪڪڙي جي سڃاڻپ هئڻ ضروري آهي. بيضا ڏيڻ واري ڪڪڙي جو موڙ ڳاڙهو ۽ ملائم هوندو آهي. اڪيون چمڪدار ۽ ڳاڙهيون هونديون آهن. ڇهن جو رنگ اڇاڻ مائل هوندو آهي.

جيڪڏهن ڪڪڙي ۾ اهي خاصيتون نه هجن ته هن جو تعلق سني نسل سان نه آهي ۽ اهي بيضا نه ڏيندي هوندا. اهڙين ڪڪڙين کي رکڻ خان خوراڪ جو خرچ وڌندو آهي. انهي ڪري انهن کي ذبح ڪري کائڻ کپي يا چڙي ڏجي.

بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين جي لاءِ جاءِ ڏيڻ جو انتخاب

1. ڪڪڙ هڪ زندهه مشين آهي. ان مان وڌ کان وڌ فائدو حاصل ڪرڻ جو بهترين طريقو هي آهي ته انهي چرندڙ ڦرندڙ مشين جي لاءِ اهڙو خوشگوار ماحول پيدا ڪيو وڃي جنهن سان انهي پيدا واري ماحول جي صلاحيت وڌي.
2. ڪڪڙ فطري طور تي خاموش، اونداهي، محفوظ ۽ هوادار جاءِ ۾ بيضا ڏيڻ پسند ڪندي آهي، تنهن ڪري ان لاءِ صحتمند ماحول جو انتظام ڪيو وڃي.

6. آکیرن جي اندرئين پرال يا پورو هر روز يا هڪ ڏينهن کان پوءِ اٺائڻ ڪپي ته جيئن فرش پسيل يا گندو نه ٿئي، مهيني ۾ هڪ دفعو پراڻو پلال اڇلائي نئين تهه وڃائڻ گهرجي پراڻي پرال بهترين پاڻ طور استعمال ٿي سگهي ٿو.
7. ڪڪڙين جا آکيرا اهڙي جاءِ تي رکيا وڃن جتي کوٽا، نور يا ٻيا نقصان پهچائيندڙ جانور بيضن کي ضايع نه ڪري سگهن.
8. جيڪڏهن گهڻي تعداد ۾ ڪڪڙيون پالڻيون هجن ته هر سئو ڪڪڙين جي لاءِ 20 آکيرا تيار ڪيا وڃن.
9. لوهه جا آکيرا مضبوط هوندا آهن. ڪاٺي جي آکيرن کي وڏو هي لڳڻ جو خطرو هوندو آهي ۽ ان ۾ جراثيم به پيدا ٿي سگهن ٿا. ان کان علاوه ضرورت ختم ٿيڻ تي لوهه آساني سان وڪرو به ڪري سگهجي ٿو.
10. آکيرا اهڙي هنڌ رکيا وڃن جتي ڪڪڙين کي چڙهڻ ۽ لهڻ وقت انهن کي ڪيرائي نه سگهن.

3. بيضا ڏيڻ واري ڪڪڙ لاءِ شيد انهن جي تعداد جي مطابق کليل خشڪ ۽ هوادار هئڻ گهرجي.
4. شيد جي سامهون ڪڪڙين جي چرڻ ڦرڻ لاءِ جاري سان بند ٿوري جڳهه هئڻ گهرجي.
5. آکيرن کي جتي ڪڪڙي بيضو ڏي ٿي هر مهيني گندرف جي پاڻوڊر جا لال دوا (پوٽيشم پر ميگنيمنٽ سان ڌوئڻ گهرجي ۽ بعد ۾ فرش تي لال (خشڪ) سڪل گاهه يا ڪاٺي جو پورو پڪيڙي ڇڏڻ گهرجي، صفائي رکڻ سان ڪڪڙين ۾ بيماري ڦهلجڻ جو خطرو نه هوندو آهي.



ڪڪڙين مان وڌيڪ بيضا حاصل ڪرڻ

ڪڪڙيون مان وڌيڪ بيضا حاصل ڪرڻ لاءِ هيٺين ڳالهين جو خيال رکڻ ضروري آهي.

1. مارچ، اپريل ۾ ڪڪڙيون وڌيڪ تعداد ۾ بيضا ڏينديون آهن.
2. سيپٽمبر، آڪٽوبر ۾ عموماً ڪڪڙيون معياري بيضا ڏينديون آهن.
3. اعليٰ نسل جون ڪڪڙيون ننڍي عمر ۾ بيضا ڏيڻ شروع ڪن ٿيون.
4. ڪڪڙين مان وڌيڪ ۽ صحتمند بيضا حاصل ڪرڻ لاءِ انهن کي ڪئلسيم، ڪوڪ، مڪئي ۽ سائي چاري مان تيار ڪيل خوراڪ وڌيڪ مقدار ۾ ڏيو.
5. انهن ڪڪڙين کي ڪافي مقدار ۾ تازو ۽ صاف سٿرو پاڻي مهيا ڪريو.
6. جيڪڏهن ڪڪڙين کي متوازن خوراڪ، بهترين سارسنيال تازو پاڻي ۽ سٺو ماحول ميسر هجي ته گهڻي مقدار ۾ سٺا ۽ صحتمند بيضا ڏينديون.
7. تيز هوا، تيز روشني، گرمي جي درجي وڌيڪ تبديلي جي دوران ڪڪڙيون پريشان رهن ٿيون.

تنهنڪري انهن جي بيضا ڏيڻ جي صلاحيت ۾ ڀڄڻ گهٽتائي ٿئي ٿي.

بيضا

جيئن ته اسان اڳ ۾ به چئي چڪا آهيون ته بيضو پروٽين جو ڀرپور خزانو آهي، جيڪو ڪڪڙين جي بدولت اسان تائين پهچي ٿو. سٺي خاصيت جا بيضا لسا ۽ صاف شفاف هوندا آهن ۽ مارڪيٽ ۾ مهانگي اگهه تي وڪرو ٿين ٿا. جڏهن ته ناقص، نرم ۽ خول وارا نامناسب شڪل وارا بيضا پسند نٿا ڪيا وڃن.

بيضو زردي سفيدي ۽ خول يعني انهن ٽن شين سان ملي ٿو. انهن ٽنهي شين جو تناسب ڪيترو آهي. انهي جي باري ۾ ٿورا ماڻهو معلومات رکن ٿا. هي تناسب ڄاڻڻ کان پوءِ اسان کي اهو معلوم ٿيندو ته بيضو هڪ وڌندڙ ٻار يا بيمار، ڪمزور ماڻهن جي لاءِ ڪيترو مفيد آهي. صحتمند ڪڪڙين جا بيضا غذا ۽ غذائيت جو بهترين خزانو آهن.

بيضي جو معياري وزن اٽڪل 20 گرام هوندو آهي. تنهن هوندي به متوازن کاڌو ۽ موزون ماحول ۾ پاليل سٺي نسل جون اڪثر ڪڪڙيون 65 گرام تائين جا وزني بيضا به

ڏينديون آهن. بيضا عام طور تي سفيد يا ڪليجي نما رنگ جا هوندا آهن. انهن جي رنگ جو انحصار ڪڪڙين جي هلڪي يا گهري رنگ تي هوندو آهي.

عمده بيضن جي سڃاڻپ

عمده بيضن ۾ هيٺين گهڻن جو هئڻ ضروري آهي:

1. بيضي جو وزن نه تمام گهڻو هجي ۽ نه ئي گهٽ، وزن جو دارومدار ڪڪڙين جي نسل تي به هوندو آهي.
2. بيضا هڪ هفتي کان وڌيڪ پراڻا نه هجن.
3. بيضي جي شڪل موزون هجي.
4. بيضي جي رنگ اڇو يا ڪليجي نما هجي.
5. بيضي جو چلڪو بي داغ ۽ مضبوط هجي چلڪو تٽل نه هجي چاڪاڻ ته بيضن جو خول جيترو مضبوط ۽ صاف هوندو اوترو ئي وڌيڪ بيضو چوزو ڪيڻ لاءِ موزون هوندو.

بيضي جي مضبوطي ۽ ان جي موزون شڪل جو دارومدار پکين جي عمر، نسل، ماحول ۽ صاف ستري پاڻي جي فراهمي تي هوندو آهي. جيتوڻيڪ بيضي جو خول ظاهري طور تي صاف ۽ لسو نظر اچي ٿو. پر دراصل هي

ڪرڌور هوندو آهي ۽ انهن سوراخن جي ذريعي روشني گرمي ۽ گرم اندر داخل ٿي بيضي کي متاثر ڪري ٿي. وڌيڪ گرمي ۾ پيل بيضن جي سفيد سڪي وڃي ٿي. زردِي چڏي، نرم ۽ ڪاري ٿي وڃي ٿي ۽ پنهنجي اصل جاءِ کان هٽي وڃي ٿي.

بيضي جو خول لوڻياڻ سان ٺهيل هوندو آهي ۽ ان معدنيات مان آهي جو بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين جي کاڌي ۾ معدنيات شامل ڪئي وڃي ٿي. نامناسب ماحول ۾ پيل بيضن جو وزن گهٽجي وڃي ٿو. تنهنڪري بيضن کي هميشه ٿڌي ۽ هوادار جاءِ ۾ رکڻ ضروري آهي.

1. بيضو نه وڌيڪ ڊگهو ۽ نه ئي وڌيڪ گول هجي.
2. بيضا وڻين کان پاڪ هجن ۽ انهن تي ڪنهن قسم جي گندگي نه هجي، جيڪڏهن گندگي لڳل هجي ته انهي کي کاغذ سان رڳڙي صاف ڪرڻ کپي.
3. بيضي کي جيڪڏهن روشني ۾ ڏنو وڃي ته ان ۾ گوشت ۽ خون جا نشان نظر نه اچن.

بيضن جي حفاظت

1. بيضا پلاسٽڪ يا رپڙ جي ٽوڪري ۾ زخيو ڪيا وڃن.

2. ڪڪڙين جي آڪيرن مان بيضا تي دفعا گڏ ڪيا وڃن.
3. بيضن کي تڏي ۽ هوادار جاءِ ۾ رکيو وڃي.
4. گرمين (اونهارِي) ۾ بيضا تن کان وڌيڪ دفعه (پيرا) گڏ ڪري سگهجن ٿا. ڇاڪاڻ ته وڌيڪ گرمي ۽ رکڻ سان انهن جي زردِي پڪڙجي وڃي ٿي ۽ سفيد سُڪي وڃي ٿي. جنهن سان بيضن جي وزن تي برو اثر پوي ٿو. بيضو جيترو تازو هوندو اوترو ئي صحت لاءِ مفيد هوندو.
5. بيضن کي سنڀالڻ وقت انهن جي درجہ بندي ڪئي وڃي. گندا، ننڍا ۽ داغدار بيضا الڳ رکيا وڃن.
6. بيضن جا داغ صاف ڪري انهن کي تڏي جاءِ ۾ رکيو وڃي.
7. وڪرو ڪرڻ وارن بيضن کي معمولي تيل لڳائي ڇمڪايو وڃي جنهن سان اهي ڇمڪڻ لڳن ٿا. ليڪن چوزا ڪڍائڻ وارن بيضن کي تيل نه لڳايو وڃي ۽ نه ئي ڌوتو وڃي.
8. ڌوئڻ سان انهن جي اندر پاڻي هليو ويندو آهي. تيل لڳائڻ سان انهن جا سوراخ بند ٿي وڃن ٿا. جنهن سان چوزن جي پيداوار تي خراب اثر پوي ٿو.

9. بيضن کي وڌيڪ لوڏڻ ۽ جهٽڪي لڳڻ کان به بچايو وڃي، نه ته انهن جا اندروني حصا پاڻ ۾ گڏجي ويندا ۽ انهن مان چوزا تمام گهٽ نڪرندا.
10. بيضا گاسليٽ، بصر، ٿوم، خوشبودار ۽ بدبودار شين جي ويجهو ذخيرو نه ڪيا وڃن ڇاڪاڻ ته ڪير وانگر بيضا به هر قسم جي بوءِ ۽ بدبوءِ کان تمام جلد متاثر ٿين ٿا.
11. بيضن کي تاريخ وار گڏ ڪيو وڃي.
12. بيضا هميشه ايگ ٽري (Egg Tray) ۾ رکيا وڃن چوٽه ان ۾ تٽڻ جو خطرو تمام گهٽ هوندو آهي. ٽري ۾ بيضي جو سنهو سوراخ هيٺين طرف ۽ تلهو حصو مٿئين طرف رکڻ گهرجي، بي ترتيب طريقي سان رکيل بيضن جي جلدي خراب ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي.
13. بيضن کي گهميل جاءِ ۾ گڏ ڪيو وڃي ڇاڪاڻ ته گهر سوراخن جي ذريعي بيضي جي اندر داخل ٿي ان کي متاثر ڪري ٿي.
14. بيضي کي هڪ هفتي اندر وڪرو ڪرڻ جو انتظام ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن جلدي وڪرو نه ٿي سگهي ته انهن کي فرج ۾ رکيو. جيڪڏهن فرج نه هجي ته پسيل جاءِ تي بيضا پڪيڙي رکيو ليڪن اهي بيضا پسيل هئڻ

جي ڪري چوڙا ڪڍڻ لاءِ موزون نه هوندا آهي ڪاٺ لاءِ استعمال ڪيو.

بيضن جو وڪرو

- خوبصورت رنگ ۽ قدرتي شڪل جا بيضا جيڪي تتل نه هجن مارڪيٽ ۾ مهانگي آگهه تي وڪرو ٿين ٿا، تنهنڪري بيضا وڪرو ڪرڻ لاءِ هيٺين ڳالهين جو خيال رکڻ گهرجي.
1. هم شڪل، هم وزن ۽ هڪ رنگ جا بيضا هڪ جاءِ تي رکيا وڃن.
 2. بيضا ٿڌي وقت دوران مارڪيٽ ۾ پهچايا وڃن ٻي صورت ۾ جيئن اوهين پڙهي چڪا آهيو ته وڌيڪ گرمي سان بيضن جي زردِي ڇڏي ٿيڻ ۽ سفيدي سڪڻ جو خطرو هوندو آهي.
 3. بيضن کي پيڪ ڪرڻ يعني رکڻ کان اڳ پهرين داغ وغيره کان پاڪ ڪرڻ ضروري آهي. بهتر هي آهي ته انهن کي ڪنهن ڪپڙي يا ڪاغذ سان صاف ڪيو وڃي.
 4. بيضن کي ويجھي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪرڻ جو بندوبست ڪيو وڃي.
 5. بيضن جي پيڪيٽن کي هميشه چانو واري جاءِ ۾ رکيو وڃي.

6. پيڪيٽن جي اندر ڪافي مقدار ۾ بورو يا گاهه ڀريو وڃي.

بيضن تي هوا، گهم ۽ گرمي جي درجي جا اثر

هوا ۽ روشني

مناسب روشني ۽ هوا سان بيضن تي سٺا اثر پون ٿا، انهن جي گهٽتائي يا واڌ سان بيضا ضايع ٿيڻ جا وڌيڪ امڪان هوندا آهن.

انهي ڪري بيضن کي تازو ۽ گهڻي وقت تائين محفوظ رکڻ لاءِ مناسب روشني ۽ هوا جو انتظام هڻڻ گهرجي.

هوا ۽ گهم

هوا ۾ گهم جي تمام گهڻي گهٽتائي سان بيضي جي زردِي ۽ سفيدي سُڪي وڃي ٿي، جنهن سان بيضي جو وزن گهٽ ٿئي ٿو. هوا ۾ گهم جي وڌڻ سان بيضي جي جلدي خراب ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي.

گرمي جي درجي جي واڌ

گرمي جي درجي جي واڌ سان بيضي جي سفيدي سُڪي سنهي ٿي وڃي ٿي ۽ خول ۾ بيحد فرق ٿي وڃي ٿو.

تنهنڪري بيضن کي هميشه ٿڌي ۽ خشڪ جاءِ تي گڏ ڪري رکڻ کپي. جيئن ته اسان اڳ به چئي چڪا آهيون ته بيضن کي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين پهچائڻ وقت به هن ڳالهه جو خيال رکڻ ضروري آهي ته بيضا ٿڌي وقت يعني شام يا صبح جي وقت بازار وغيره پهچايا وڃن بيضن کي گندن ڪريتن ۾ رکڻ سان جراثيم اندر داخل ٿي ان کي جلدي خراب ڪري ڇڏيندا آهن.

7. پاڻي سان ڌوتل بيضا چوزا ڪڍائڻ جي لاءِ مناسب نه هوندا آهن.
8. بيضا ٿلها ۽ تازا هجن ته جيئن صحتمند چوزا نڪرن.
9. بيضا هڪ ئي نسل جي ڪڪڙين جا هجن.
10. بيضا جوان ڪڪڙين جا هجن.
11. اهڙين ڪڪڙين جا بيضا نه ورتا وڃن جن سان گڏ پوڙهو ڪڪڙ ڇڏيل هجي.

آري لاءِ ڪڪڙين جي چونڊ

بيضن مان چوزا ڪڍائڻ لاءِ جيڪا ڪڪڙي چونڊي وڃي ان ۾ هيٺيون وصفون هئڻ ضروري آهن.



چوزا ڪڍڻ لاءِ بيضن جي چونڊ

1. بيضن جو خول مضبوط ۽ سوراخن وارو هجي.
2. بيضا پراڻا نه هجن.
3. بيضا صاف سڌي ۽ صحيح گرمي جي درجي تي گڏ ڪيل هجن.
4. بيضا اهڙين ڪڪڙين مان ورتا وڃن جنهن سان گهٽ ۾ گهٽ 10 ڏهن ڏينهن ڪڪڙ رهندڙ هجي.
5. بيضا بيمار ڪڪڙين مان حاصل ٿيل نه هجن.
6. بيضا اهڙين ڪڪڙين کان ورتا وڃن جن کي متوازن کاڌو ۽ سائو چارو جي پوري مقدار ڏنل هجي.

- ڪجهه مٿي هجي ته جيئن ڪڪڙي چرڻ ڦرڻ دوران انهن کي ٽوڙي نه وجهي.
4. آري لاءِ ڪڪڙ اهڙي هجي جيئن گهٽ ۾ گهٽ ٻه دفعا بيضن مان چوڙا ڪڍيا هجن.
5. ڪڪڙي وڏو ڪان وڏو پرن ننڍن جنگهن واري هجي ته جيئن بيضا سولائيءَ سان پنهنجي پرن جي هيٺان لڪائي سگهي.



6. آري لاءِ اهڙي ڪڪڙي چونڊيو جنهن کي بيضن تي ويهڻ جي قدرتي عادت هجي.

1. ڪڪڙ آري لاءِ پوري طرح تيار هجي. جيڪڏهن هو پوري طرح تيار نه هوندي ته ڪجهه ڏينهن بيضن تي ويهي انهن کي ڇڏي ڏيندي. اهڙي طرح سڀ جا سڀ بيضا ضايع ٿي ويندا.
2. ڪڪڙن کي بيضن تي ويهارڻ کان پهرين اها تسلي ڪريو ته ان جي جسم تي جُون، چچڙ وغيره نه ڪونه آهي. ٻي صورت ۾ انهن بيمارين جا جراثيم نڪرندڙ چوڙن ۾ منتقل ٿي ويندا.
3. آري واري ڪڪڙ جي هيٺان بيضا ڪنهن ڪاٺي جي دٻي، مٽي جي ٿانوَ يا ڪنهن ٽوڪري ۾ بُوهُ وجهي آيو بيضا اهڙي طرح رکيو جيئن انهن جو ويڪرو حصو



7. بيضا رکڻ جي ٻن ڏينهن کانپوءِ اتي جو جائزو وٺو ۽ جيڪي بيضا ڪڪڙي پنهنجي پرن جي هيٺيان لڪائي نه رکيا هجن اهي ڪڍي ڇڏيو ۽ کاڌي طور استعمال ڪريو.



8. بيضن ڦوڙڻ کي وڌيڪ دائو ۽ پاڻي ڏيو ته جيئن صحتمند رهي.

9. بيضا ڦوڙڻ آري واري ڪڪڙي کي ڪڏهن به نه ڍڪيو انهي کي پنهنجي مرضي سان خوراڪ ۽ پاڻي لاءِ اٿڻ ڏيو. البت جيڪڏهن ٻلي وغيره جو خطرو هجي ته رات جو پورڻ ڪپي.

10. جيڪڏهن ڪڪڙي کي ڍڪڻ ضروري هجي ته انهي کي 24 ڪلاڪن ۾ هڪ دفعو کاڌي لاءِ ضروري اٿاريو ۽ ان جي غير موجودگي ۾ بيضن کي ڍڪي رکيو، جيئن انهي گرم ۽ محفوظ رهن.

11. بيضا ڦوڙڻ دوران ڪڪڙي لاءِ هلڪي روشني ۽ هوا جو مناسب انتظام هڻڻ گهرجي.

12. ڪڪڙي جي هيٺيان وڏو کان وڏو ٻارهن بيضا رکيا وڃن ته جيئن اهو ان کي سولائي سان پرن جي هيٺيان لڪائي سگهي.

13. اونھاري ۾ ايڪويهن ڏينهن کانپوءِ ۽ سياري ۾ ٻاويهن ڏينهن کانپوءِ بيضن مان ٻچا نڪرڻ شروع ٿي وڃن ٿا. ٻچا نڪرڻ بعد انهن جا خول ٻاهر اڇلايو ۽ ڪڪڙي ۽ چوڙن کي ڪنهن صاف جڳهه تي منتقل ڪري ڇڏيو.

ڪڪڙين جون بيماريون

هر سال ڪيترائي پکي مختلف بيمارين جو شڪار ٿي مري ويندا آهن. تنهنڪري هن شعبي سان لاڳاپيل حضرات کي ڪڪڙن ۾ پکڙجندڙ بيمارين جي باري ۾ ڄاڻ رکڻ نهايت ئي ضروري آهي.

ٿا نڪ ۽ وات مان لسيدار مادو وهڻ لڳي ٿو. وٺ پٽڙي يا دستن جهڙي هوندي آهي. بيمار ٿيڻ کانپوءِ اڪثر اهي پڪي زنده نه بچندا آهن.

احتياط

1. بيمار ۽ مئل پڪين کي جلد کان جلد الڳ ڪري ڇڏيو.
2. شيڊ جي مڪمل صفائي ڪرايو.
3. ڪمري جي سڀني ديوارن کي چونو ڪرايو.

بچاءُ

انهي بيماري جي بچاءُ لاءِ چوزن کي حفاظتي ڦڙا يا ٽڪا لڳايا وڃن ٿا. اهي ٽڪا ماهرن جي مشوري سان لڳائڻ گهرجن.

ست کان ڏهن ڏينهن جي چوزن ۾ راڻي ڪيٽ ويڪسين جو پاڻي ۾ حل ٿيل هڪ هڪ ڦڙو ٻنهي اکين ۾ وجهن ٿا. انهي کانپوءِ چئن هفتن ۽ پوءِ سورنهن هفتن جي عمر ۾ چمڙي جي اندر ٽڪو لڳايو وڃي ٿو.

راڻي ڪيٽ، ماما، ڪالرا، پلورم، ٽائيفائيڊ، نزلو، تي.بي (خوني پيچس) رتاوان دست، جوڻين ۽ چچڙين وغيره ان سان بچاءُ جو بهترين علاج متوازن کاڌو، صحتمند ماحول ۽ بهتر سارسنيال آهي. ان کان علاوه انهن بيمارين جي حفاظتي ٽڪا استعمال ڪري اسين پڪين کي گهڻي حد تائين بيمارين کان محفوظ ڪري سگهون ٿا. اڇوت هائڻي ڪجهه بيمارين جي باري ۾ تفصيل سان ڳالهه ٻوله ڪريون.

راڻي ڪيٽ

هي ڪڪڙين جي بيحد موذي ۽ خطرناڪ بيماري آهي ۽ هڪ وائرس سان پيدا ٿيندي آهي. هي وائرس يا جراثيم بيمار پڪين جي پيٽ، نڪ چنهنب مان خارج ٿيندڙ پاڻي ۾ موجود هوندو آهي. راڻي ڪيٽ جو مرض تمام تيزي سان بيمار کان تندرست ڪڪڙين ۽ چوزن ۾ پکڙجي ٿو.

نشانيون

شروع ۾ پڪي سست ۽ موڳا لڳن ٿا. کاڌي ۾ گهٽتائي اچي ٿي. بيمار پڪي هڪ ڪنڊ ۾ گڏ ٿين ٿا وات کولي ساهه کڻن

پلورم

هي مورثي بيماري آهي ۽ ڪڪڙي کان چوزن تائين پهچندي آهي. هن بيماري ۾ چوزا بيضن کان نڪرندي ئي بيمار ٿي وڃن ٿا. هي تمام ڪمزور هوندا آهن. سائي رنگ جون نرم نرم روڻون ڪن ٿا. وڻيون لسيدار هئڻ جي ڪري ان جي جسم جي پوئين حصي تي چهتي پون ٿيون. بيمار ٿيڻ کانپوءِ 30 کان 40 سيڪڙو چوزا مرڻ شروع ٿي وڃن ٿا. هن بيماري جا جراثيم بيمار ڪڪڙين جي اندر داخل ٿي وڃن ٿا. جنهن ڪري هي بيماري بيضن مان نڪرندڙ چوزن ۾ پڪڙجندي آهي. اهڙن چوزن کي سلفاميٿاڊائن پاڻي ۾ ڳاري ڏيو ته نتيجا سٺا ملندا.

ماتا

پکين کي ماتا جي بيماري کان بچائڻ لاءِ پهريون اٺن هفتن جي عمر جي چوزن کي لڳايو پوءِ ٻيو ٽڪو ان وقت لڳايو جڏهن پکين جي عمر ڇهه مهينا ٿي وڃي.

رتاوان دست

هن بيماري جا جراثيم ڪڪڙين جي معدي ۽ نيڪال واري جاءِ جي اندر موجود هوندا آهن. هي جراثيم انهن جي

آندڻ ۾ واڌ ويجهه شروع ڪن ٿا. ۽ آندڻ کي زخمي ڪري وجهن ٿا جنهن ڪري چوزا مرڻ شروع ڪن ٿا. هن بيماري ۾ مبتلا چوزا ڪاٺ پيئڻ ڇڏي ڏين ٿا ۽ انهن جي وڻين سان گڏ رت اچڻ شروع ٿي وڃي ٿي. انهي حالت ۾ پکين کي سلفاڊاٿماڊين پاڻي ۾ ملائي ڏيڻ سان هن بيماري ۾ فرق اچي وڃي ٿو. ليڪن رتاوان دستن لاءِ ڪوبه هڪ دوا لڳاتار استعمال نه ڪئي وڃي دستن جون پيون به ڪڪڙين لاءِ دوائون موجود آهن.

نيوڪيسل

نيوڪيسل بيماري جي بچاءَ لاءِ ويڪسين (ٽڪا) نهايت ضروري آهن. چوزن جي نڪ ۽ اکين ۾ دوا جا ڦڙا وڌا وڃن ويڪسين جو پکين تي اسپري يا چٽڪار به ڪري سگهجي ٿو.

چچڙيون

چچڙيون سان پکين کي بخار ٿي ويندو آهي. جنهن سان وڏي پيماني تي نقصان ٿيندا آهن. گوناڻي سطح تي تمام گهٽ ڪڪڙيون هن حملي کان محفوظ رکي سگهجن ٿيون. انهي لاءِ شيد جي مڪمل صفائي رکڻ بيحد ضروري

آهي. فرش، جراثيم ڪش (لال دوا) ڪاربوڪ اسيد وغيره دوائون مليل پاڻي سان ڌوڻو وڃي. اهڙي طرح ٻين بيمارين کان بچاءَ لاءِ فارم جي صفائي جو بيحد خيال رکڻ ضروري آهي. جڏهن به ڪنهن ڪڪڙين يا چوڙي جي بيماري هئڻ جو شڪ هجي ته انهي کي فوراً ٻين پکين کان الڳ ڪريو. علاج ۽ حفاظتي ٽڪن جي باري ۾ ڪنهن مستند پولٽري فارم يا جانورن جي ڊاڪٽر کان معلومات حاصل ڪريو.

ڪڪڙين ۾ خراب عادتون

ڪڪڙين ۾ خراب عادتون هڪ ناپسنديده عمل آهي. جيڪو هڪ يا ان کان وڌيڪ پکين ۾ ظاهر ٿي سگهي ٿو. ۽ هي موت جي شرح ۾ اضافي ۽ ڪاروبار ۾ نقصان جو سبب بڻجي ٿو. ڪڪڙين ۾ خراب عادتون هيٺيون ٿي سگهن ٿيون.

گوشت کائڻ جي عادت

هي عادت بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين (ليئرز) ۽ برائيلر ٻنهي ۾ ٿي سگهي ٿي. پکين ۾ جڏهن هي عادت پيدا ٿي

ويندي آهي ته هو ٻين پکين تي حملو ڪري انهن کي زخمي ڪري ڇڏين ٿا. ٻيا پکي زخمي ڪري پڻ کوٽين ٿا. ايتري قدر جو زخمي پکي رت وهي وڃڻ جي ڪري آخرڪار مري ويندا آهن. هڪڙي ئي واقعي سان سڄي فلاڪ ۾ انهي خراب عادت جو رجحان عام ٿي ويندو آهي. گوشت خوري يا ڪيترائي قسم آهن. مثال طور:

1. پچ کي پٽڻ
2. ٻرن کي پٽڻ
3. پيرن کي پٽڻ موڙ کي پٽڻ

1. ٿوري جاءِ ۾ وڌيڪ پکي رکڻ
2. فارم ۾ جيڪڏهن هوا جي آمدورفت جو نظام درست نه هوندو. ته به ڪڪڙين ۾ بيچيني پيدا ٿي ويندي آهي. جنهن ڪري اهي پاڻ ۾ وڙهڻ ٿيون ۽ جڏهن هڪ دفعو رت جو مزو چڪي وٺن ٿيون ته گوشت کائڻ تي لهي اچن ٿيون.
3. جيڪڏهن برودر (چوزن کي هٿرادو طريقي سان پالڻ واري مشين) جو گرمي جو درجو وڌيڪ هجي ته ان سان چوزن جي جسم ۾ سوئيون لڳندي. محسوس ٿين

ٽيون جنهن سنا چوزا هن عادت جو شڪار ٿي ويندا آهن.

4. جيڪڏهن ڪڪڙيون، برائيلرز يا چوزن کي ڪاٺڻ ۽ پيئڻ جي لاءِ مناسب ضرورت جي مطابق جڳهه نه ڏني ويئي ته هو هڪ ٻئي کي پٽين ٿا.
5. ڳوڙهين جي صورت ۾ خوراڪ ڪارائتو.
6. خوراڪ ۾ وڌيڪ مڪائي به انهي جو سبب آهي.
7. ڪڪڙين کي کاڌي کان بغير رکڻ
8. بيضن جي آڪيرن جو تعداد گهٽ هجڻ
9. تمام گهڻي بلب جي روشني هجڻ
10. کاڌي ۾ غذائي جزن، لوڻياڻ يا لحميات جي گهٽتائي هوندي آهي.
11. ڪڪڙين کي جسم تي ٻاهرين ڪيڙن جي موجودگي يا رهائشي ڪمرن (شيد) ۾ ڪيڙن جي موجودگي.

پڇ جو پٽڻ

هي گهڻو ڪري گهڻي تعداد ۾ بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين ۾ ملي ٿي ڪڪڙين ۾ پوئين حصي جو ٻاهر نڪرڻ يا وڏي بيضي سان سوراخ (Arms) جو زخمي ٿيڻ هن جو سبب بڻجي ٿو. ڪڪڙيون جڏهن رت جو مزو چڪن ٿيون

ته گوشت خوري ٿي لهي اچن ۽ انهن کي جاري رکن ٿيون.

پرن جو پٽڻ

هي اڪثر ڪري انهن پکين ۾ ڏٺو وڃي ٿو جن کي ٿوري جڳهه ميسر هجي. غذائي جزا ۽ لوڻياڻ جي گهٽتائي هن جو هڪ سبب آهي. ان کانسواءِ ٿي سگهي ٿي. ان کانسواءِ آندڻ جي سُوخ، غذائي جزن جو پوري طرح هضم ٿيڻ نه ڏينديون.

پيرن کي پٽڻ

جيڪڏهن چوزن جي پيرن ۾ ڪا شيءِ لڳي وڃي ته انڪري رت وهي يا چوزا پسييل پوري ٿي رهن ٿي پوري انهن جي پيرن جي هيٺيان جمبي سخت ٿي وڃن ٿا ۽ آخر هي زخم جو سبب بڻجن ٿا. ان کانسواءِ گهڻي دير تائين کاڌي جو نچ ملڻ کاڌي جي ٿانون جو تمام مٿي هجڻ يا برودر کان پري هجڻ يا ٿوري تعداد ۾ هڻڻ به انهي جا سبب بڻجن ٿا.

موڙ کي پٽڻ

موڙ تي وڙهڻ دوران يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري زخم ان جو سبب بڻجي ٿو.

گوشت ڪاٽڻ کان چوٽڪارو

هن عادت کان بچائڻ لاءِ چوڙن جي چنهن کي چڏڻ گهرجي ته جيئن ڪڪڙيون هڪ ٻئي کي ماري رتورت نه ڪري سگهن. بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين ۾ عام رواجي هڪ ڏينهن، چار هفتا، اٺ هفتا يا پوءِ ارڙهن هفتن تائين جي عمر ۾ چنهن کي ڪڪڙين کي هڪ ڏينهن جي عمر ۽ پوءِ تن کان پنجن هفتن جي عمر ۾ چنهن کي ڪڪڙ گهرجي. ننڍي عمر جو چوڙن، بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين ۽ پکين ۾ مٿئين چنهن 2/3 حصا ۽ هيٺين 1/3 حصي تائين ڪڪڙ گهرجي 18 هفتن جي عمر وارين ڪڪڙين ۾ مٿئين ۽ هيٺين چنهن ٿوري برابر ڪڪڙ گهرجي.

1. ڪڪڙين کي لوڻ جو ٿوري مقدار ڏيڻ گهرجي ۽ راشن ۾ چانور يا ڪڻڪ جو چاڻ وڌيڪ ملائڻ سان به بچاءُ ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن ڏهه کان پنڊرهن سيڪڙو

گوشت جو چورو کاڌي جي فارمولي ۾ ملايو تڏهن به جي بري عادت ڇڏي وڃي ٿي.

2. ڪمري ۾ ڳاڙهي رنگ جو بلب رات جي وقت ٻاريو دروازن ۽ درين تي هلڪو ڳاڙهو رنگ ڪريو ته جيئن زخمي چوڙن کي رت نظر نه ايندو ۽ ٻيا چوڙا ان طرف ڏيان نه ڏيندا.

3. کاڌي يا پاڻي ۾ حياتين ۽ لوڻيان وجهو.

4. اندرين ۽ ٻاهرين ڪيڙن جي خاتمي لاءِ دوائون استعمال ڪريو.

5. انهن سڀني سببن جو خاتمو ڪيو وڃي جيڪي گوشت خوري جو سبب بڻجن ٿا مثال طور خوراڪ ۽ پاڻي جي لاءِ مناسب ضرورت جي مطابق جاءِ ڏني وڃي هون جي آمدورفت جو مناسب انتظام هجي تيز روشني کان پرهيز ڪئي وڃي.

6. زخمي پيرن ۽ چنبن کي بورڪ ايسڊ ۽ زنڪ لڳايو ته جيئن رت کي روڪي سگهجي ۽ جڏهن زخمي چوڙي کي ٻيهر فلاڪ ۾ وڌو وڃي ته پيرن تي (Creosote) سوليوشن لڳايو جيڪو نه فقط جراثيم ڪش آهي. بلڪ ان جو ناخوشگوار ذائقو چوڙن کي ٻيهر پيرن کي پٽڻ کان پري رکي ٿو.

7. بيضن جو ڪاٺ

هي اهڙي خراب عادت آهي جو جيڪڏهن هڪ پيرو ڪنهن ڪڪڙي ۾ پئجي وڃي ته مشڪل سان ڇٽندي آهي. هن عادت ۾ مبتلا ڪڪڙيون تمام سولائي سان سڃاڻي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته ان جي چنهن تي زردي يا سفيدي لڳل نظر ايندي آهي.

سبب / ڪارڻ

جيڪڏهن ڪڪڙي جو آڪيرو تمام ننڍو هوندو ته ان ۾ ويهي بيضا آساني سان نه ڏيئي سگهندي هجي ته بيضن جي ڀڄڻ جا وڌيڪ امڪان هوندا آهن يا اوچتو ڪو بيضو ڪڪڙي جي پيرن جي هيٺيان اچڻ سان ٿئي وڃي ته ڪڪڙي ان کي چڪي ته ان جو ڏانڦو ان کي مزيدار لڳي ٿو ۽ هي لذت انهي کي انهي بري عادت ۾ مبتلا ڪري ڇڏي ٿي.

مصري ڪڪڙيون

هي ڪڪڙيون گذريل 24 سالن کان پنهنجي ملڪ پاڪستان ۾ ملن ٿيون هنن ڪڪڙين جو اصل ملڪ مصر آهي. جتي هن جي تاريخ پراڻي اهميت واري آهي.

پاڪستان ۾ هن کي 1977ع ۾ پوليٽري ريسرچ انسٽيٽيوٽ ڪراچي ۾ آندو ويو. هن جو اصل تعلق مور واري نسل سان آهي. ظاهري ڏيک ڊي سي ڪڪڙين جهڙو آهي. يعني ڪارو اڇو رنگ آهي. جڏهن ته ڪن جو هيٺيون حصو ڳاڙهو ٿئي ٿو. چمڙي اڇي پيلي هوندي آهي.

هن جو وزن جسماني طور تي 20 هفتن ۾ 1-5 ڪلوگرام آهي. هي 72 هفتن تائين ڏيندي آهي. آخر هن جو وزن 2 ڪلوگرام ٿيندو آهي. هي زندگي ۾ 42 ڪلوگرام ڪائيندي آهي. 223 آنا ڏيندي آهي. آني جو وزن اندازاً 48 گرام خاڪي هوندو آهي. هن نسل ۾ پڪڙجندڙ عام بيمارين کان بچاءَ لاءِ ڪافي قوت برداشت موجود آهي. ان ڪري بيماريون تمام گهٽ ٿين هي سخت سردي ۽ سخت گرمي ۾ پڻ آنا ڏيندي آهي.



46

ڪڪڙيون پالي ڪماڻ جا گڙ

45

ڪڪڙيون پالي ڪماڻ جا گڙ

بھراڙيءَ وارن علائقن ۾ مصري نسل جي چوزن کي پالڻ لاءِ مفيد مشورن تي عمل ڪري هنن کي پنهنجي آمدني جو ذريعو بنايو.

1. نسل ۽ سندن واڌارو

- (1) هي نسل اسان جي بھراڙيءَ ۾ پلجندڙ دي سي نسل جي چوزن وانگر سخت جان آهي.
- (2) هي نسل جي چوزن ۽ ڪڪڙين جا فارم به کولي سگھجن.



ٿا ۽ گھريلو ماحول ۾ به پالي سگھجن ٿا.

(3) دي سي نسل جي چوزن کي ماءُ پنهنجي ڪنڀن ۾ لڪائي گرميءَ ۽ سرديءَ کان بچائيندي آهي. ليڪن مصري چوزن کي مصنوعي طور تي پهريائين چار هفته بجليءَ جي بلب يا ڪنهن ٻئي طريقي سان ماءُ واري عمل ڏيکاريو ويندو آهي.

(4) هن نسل جون ڪڪڙيون دي سي ڪڪڙين جي مقابلي ۾ وڌيڪ بيضا ڏين ٿيون. هڪ اندازي مطابق سال ۾ في ڪڪڙ به سؤ بيضا ڏين ٿيون. گوشت به کائڻ ۾ دي سي ڪڪڙين جهڙو ٿيندو آهي.

(5) مصري ڪڪڙيون ”ڪڙڪ“ نٿيون ٿين. پر جيڪڏهن توهان مصري ڪڪڙين جي بيضن مان ٻچا وٺڻ چاهيو ٿا ته دي سي ”ڪڙڪ“ ڪڪڙ هيٺيان رڪو ايڪويهين ٻچا ڦٽندا.

2. سار سنڀال

- (1) مرغباني ۾ چوزن پالڻ جو مرحلو تمام اهم هوندو.
- (2) چوزن رکڻ کان پهريائين جاءِ جي صفائي ڪرڻ ضروري آهي.

(3) چوزن رکڻ کان پهريائين خوراڪ ۽ صاف پاڻيءَ جو بندوبست ڪيو وڃي.

(4) خوراڪ ۽ پاڻي تازو ڏنو وڃي. کاڌي ۽ پاڻي جي ٿانون کي صبح شام صاف ڪيو وڃي.

(5) جڏهن ڪڪڙيون بيضا ڏيڻ شروع ڪن ته بيضن لاءِ کڏين جو بندوبست ڪيو وڃي ۽ روز صبح جو بيضا کڻجن ۽ حفاظت سان رکجن.

(6) مصري نسل جي ڪڪڙ خرج وغيره ڪڍي هڪ روپيه روزانو بچائي ڏئي ٿي.

3. خوراڪ

(1) هن نسل جي چوزن يا ڪڪڙين کي نهيل خوراڪ ڏيو. جيڪڏهن وسائل گهٽ آهن ته اهي گهمي ڦري کائي اڌ پيٽ پري سگهن ٿيون ۽ اڌ ڪڻڪ جو ڌارو، چانورن جو ڌارو، مکائي جو ڌارو ملائي ڏجي ۽ ان کان علاوه ساڻو گاهه جهڙوڪ: برسيم، سنالو وغيره به ڏجي ته بهتر ٿيندو. تازو بچيل ماني، ٻوڙ به ڏجي پر اها پڪ ڪجي ته سينوارييل يا خراب نه آهي.

(2). 4 عام بيماريون ۽ بچاءُ

جانورن وانگر ڪڪڙين ۾ به اڻ وڇڻندڙ ۽ وڇڻندڙ

بيماريون ٿين ٿيون. ۽ اهي نقصان پڻ رسائڻ ٿيون. اڻ وڇڻندڙ بيمارين کان بچاءُ لاءِ اڳواٽ ٿڪا هڻايو.

1. راڻي ڪيت

هي هڪ وڇڻندڙ بيماري آهي، جنهن کي عام طور ”لڙهو“ چيو ويندو آهي. انهيءَ بيماريءَ کان بچاءُ جا ٿڪا هنيا ويندا آهن.

(2) ٿڪن هڻڻ جو طريقو ۽ تائيمر

چوزن جي ڄمڻ کانپوءِ ستين ڏينهن اک ۾ ڦڙا وڌا ويندا آهن. ان کانپوءِ ايڪويهين ڏينهن ٿڪو هنيون ويندو ۽ ان کانپوءِ هر ٽئين مهيني بچاءُ جا ٿڪا هنيا ويندا آهن.

3. ماتا

هن بيماريءَ کان به بچاءُ جا ٿڪا لڳايا ويندا آهن، جيڪي ڇهين هفتي جي عمر ۾ لڳندا آهن.

4. ڪاڪسي ڊيوسس

رتانوان دست پيٽ جا ڪيڙا وغيره انهن بيمارين جو به علاج موجود آهي. مٿين بيمارين جون ڪڪڙين ۾

علامتون ظاهر ٿين ته فوراً ڪڪڙين جي پالڻ واري کاتي جي ماهر ڊاڪٽر سان رابطو ڪيو وڃي. انهن بيمارين جو علاج بچاءَ موجود آهي.

ڪڪڙين جي پالنا جو ڪئلينڊر

جنوري

هن مهيني ۾ سردي پنهنجي جوين تي هوندي آهي ۽ گهٽ گرمي جي درجي جي ڪري بيضا ڏيڻ وارين ڪڪڙين ۾ پيداوار گهٽجي وڃي ٿي ۽ گوشت وارين پکين جي واڌ



تي پڻ ڪافي اثر پوندو آهي. تنهنڪري پکين کي سيءَ کان محفوظ رکڻ لاءِ هن ڳالهه جو خيال رکيو وڃي ته فارم

جي اندر گرمي جو درجو گهٽ نه ٿي وڃي، گرمي جو درجو 80 تائين برقرار رکيو وڃي ته جيئن پکين جي پيداوار ۽ نشونما متاثر نه ٿئي.

اَس نڪرڻ تي فارم جون دريون کولي ڇڏجن ته جيئن فارم جي اندر اَس پوي ۽ پورو خشڪ رهي. چاڪاڻ ته گهر جي ڪري بيماري جا جراثيم ۽ اندريان ڪيڙا پيدا ٿين ٿا. مختلف بيمارين کان بچاءَ جي لاءِ دوائون ورتري ڊاڪٽر جي مشوري سان استعمال ڪرايو.

فيبروري

هن مهيني ۾ ڪن علائقن ۾ ڪافي سيءَ پوندو آهي ۽ 15 فيبروري کانپوءِ موسم خوشگوار ٿيڻ شروع ٿيندي آهي. هي مهينو ڪڪڙين جي نسل وڌائڻ لاءِ تمام موزون آهي. هن مهيني ۾ پڇا ڪڍائڻ وارين بيضن جي لاءِ ڪڪڙين کي ڪڪڙ سان گڏ 10-1 نسبت سان رکيو وڃي ته وڌيڪ پيداواري صلاحيت وارا بيضا حاصل ٿي سگهن ٿا. ڳوٺاڻي سطح تي آري واريون ڪڪڙيون بيضن تي ويهاري سگهجن ٿيون.

جيڪڏهن هن مهيني ۾ به سيءَ وڌيڪ هجي ته هٿرادو

طور تي فارم کي گرم رکيو وڃي. انهي لاءِ بجلي جا هيٽر ۽ کوئلي جي سگري استعمال ڪري سگهجي ٿي.



چوزا ڪڍائڻ لاءِ موزون بيضن جي چونڊ تمام ضروري آهي وزن 20 ڪلوگرام کان گهٽ نه هجي چلڪو هموار ۽ چمڪدار هجي. ڪوشش ڪئي وڃي ته انهن نسل جي ڪڪڙين سان نسل ڪشي ڪرائي وڃي. جنهن نسل جون ڪڪڙيون هجن ته جيئن اهو نسل برقرار رهي ڪڪڙ ۽ ڪڪڙين جو صحتمند هئڻ به ضروري آهي.

مارچ

هن مهيني ۾ سيءُ گهٽجي ويندو آهي. ۽ بهار جي موسم شروع ٿي ويندي آهي. تنهنڪري موسم جي لحاظ سان فارم جي هڪ پاسي جا پليا لاهي ڇڏيو.

گذريل مهيني جا رکيل بيضن مان چوزا نڪرڻ شروع ٿي ويندا آهن. موسم جي تبديلي جي ڪري چوزن جي پرورش پالنا ۾ سولائي ٿيندي آهي. ۽ ان دوران نڪرندڙ چوزا ايندڙ سردي جي موسم جي شروعات تائين بيضا ڏيڻ شروع ڪندا آهن. چوزن نڪرڻ جي ڏهن ڏينهن کانپوءِ رات ڪيٽ ويڪسين 1-5 ڳار ٺاهي هر چوزي جي اک ۾ هڪ هڪ ڦڙو وجهو، انهن هفتن جي عمر ۾ ماما جو ٽڪو لڳايو، 4-6 هفتن جي عمر ۾ اڪثر رتاوان دستن جو امڪان هوندو آهي. انهي کان بچاءُ لاءِ وٽرني ڊاڪٽر سان مشورو ڪريو. تجويز ڪيل دوائون هدايتن جي مطابق استعمال ڪريو ڪمرن ۾ 40 واٽ جو بلب لڳايو ته جيئن پکين ۾ وڌيڪ روشني جي ڪري پٽڻ جي عادت نه پوي. ڏينهن ۾ به ٿي پيرا ٿرماميٽر سان گرمي جو درجو نوٽ ڪريو. ڪاروباري سطح تي بروڊر جي ذريعي چوزن جي پالنا دوران گرمي جي درجي جو خاص خيال رکيو وڃي ۽ ٿرماميٽر جي ذريعي

گرمي جو درجو نوت ڪرڻ گهرجي.

اپريل

هي مهينو چوزن جي نشونما جي لحاظ کان خاص اهميت رکي ٿو.



چاڪاڻ ته هن مهيني ۾ موسمي اثرن جي ڪري بهتر نشونما ٿيندي آهي. تنهنڪري ضروري آهي ته چوزن جي عمر ۽ وزن جي حساب سان الڳ ڪيو وڃي ته جيئن

ويڪري جاءِ ۽ صحيح خوراڪ ملڻ جي ڪري چوزن جي پرورش موزون ٿئي. هڪ هفتي کان اٺن هفتن تائين جي عمر جي 100 چوزن کي 100 چورس فوٽ جڳهه گهريل هوندي آهي. چوٽه هن مهيني ۾ موسم ڪافي بدلجي وڃي ٿي. انهي ڪري خاص خيال رکيو وڃي. پورو آلو ٿيڻ تي جلد تبديل ڪريو.

ڪنهن قسم جي بيماري جي صورت ۾ ڊاڪٽر سان مشورو ڪريو ته ڏنل هدايتن تي سختي سان عمل ڪريو، بيمار پکين کي صحتمند کان الڳ ڪريو. ضرورت کان وڌيڪ ۽ سٺي نشونما وارا چوزا وڪرو ڪريو. هي مهينو به چوزا ڪيائڻ لاءِ موزون آهي.

مئي

هن مهيني کان اونهارو شروع ٿي ويندو آهي. هن مهيني ۾ ڪڍيل چوزن مان سٺا نتيجا نٿا ملن چوزن جي نشونما ۾ به گهٽتائي اچي ويندي آهي. ۽ خوراڪ جي نسبت چوزا پاڻي وڌيڪ پيئندا آهن. ٻن پهرن جي وقت پکين کي گرمي جي شدت کان بچائڻ لاءِ درين تي پليا يا بوريون لڳائي پاڻي جي چٽڪار ڪريو، ڪڪڙين کي تعداد جي مطابق جاءِ فراهم ڪريو ته جيئن هڪ ٻئي کي زخمي نه ڪن گرمي

بلب ٻاري ڇڏيو ته جيئن رات جو پڪي خوراڪ کائي سگهن.

آندڻ جي ڪيڙن جي بچاءَ لاءِ ڪمرن ۾ ڪيومڪس هڪ سيڪڙو ڳار تيار ڪري چٽڪار ڪريو. ٻئي ڪنهن به بيماري جي صورت ۾ ڊاڪٽر سان رجوع ڪريو.

جولاءِ

هن مهيني ۾ شديد گرمي هوندي آهي. تنهنڪري اهي انتظام برقرار رکڻ جيڪي گذريل مهيني ڪيا ويا هئا. احتياط جي طور تي فارم ۾ ٻاهران ڪوبه ڪڪڙي پڪي نه اچڻ ڏيو.



کان بچاءَ لاءِ ڪمرن کي ٿڌو رکڻو. پيئڻ جو پاڻي ڏينهن ۾ تي چار دفعا ضرور تبديل ڪريو، جن پڪين کي ماما جو ٽڪو نه لڳايل هجي انهن کي ماما جو ٽڪو لڳرايو، جيڪڏهن تجارتي سطح تي چوزن جي پرورش مشين (بروڊر) سان ڪئي وڃي ته گرمي جي درجي ۾ هر هفتي گهٽتائي ڪندا رهو. اهڙي طرح 6 يا 7 هفتن کانپوءِ بروڊر جي ضرورت نه رهندي. ڪمزور پڪين جي چاڻي ڪري انهن کي وڪرو ڪجن. برائلر چوزا هجن ته انهن جو وڪرو جاري رکڻو ۽ وڌيڪ فرئلر چوزا نه گهرايا وڃن.

جُون

هي سال جو گرم ترين مهينو آهي. هن ۾ ڪڪڙيون پر ڪيرائين ٿيون ۽ ڪمزور ٿي وڃن ٿيون. گرمي جي ڪري کاڌو گهٽ ۽ پاڻي وڌيڪ پيئن ٿيون. تنهنڪري ڏينهن ۾ تي چار ڀيرا صاف ۽ ٿڌو پاڻي ڏيڻ گهرجي، ٻنپهرن جو ڪڪڙين کي لڪ کان بچائڻ لاءِ فارم جي درين تي، چڪون لڳل رهڻ ڏيو جيڪڏهن بجلي هجي ته پوءِ پنڪا به استعمال ڪري سگهجن ٿا. مارچ اپريل ۽ مئي جي مهينن ۾ نڪتل چوزا عمر جي لحاظ کان الڳ الڳ رات جو ڪمرن ۾

چاهي هو صحتمند چونه هجي. جيتوڻيڪ هڪ ڏينهن جا چوڙا آڻي سگهجن ٿا. پر ڪيرائڻ جي دوران جيڪي ڪڪڙيون بيضا ڏيڻ بند ڪن انهن کي وڪرو ڪيو وڃي. فارم جي اندر صفائي جو خاص خيال رکڻو. فارم جي چوڌاري ۽ نالين ۾ چن چڙڪايو. بيماري جي دوران مرڻ وارين مئل ڪڪڙين کي کڏ ڪوٽي دفن ڪريو، ۽ بيماري جي سڃاڻپ واري ليبارٽري جي سهولت دستياب هجي ته بيمار ۽ مئل پکين جو پوسٽ مارٽم ڪرايو ۽ ڊاڪٽر جي هدايت تي عمل ڪريو.

ڪنهن ٻئي فارم کان ڪوبه پکي، برتن يا ڪو ٻيو سامان هرگز نه آڻيو.

آگسٽ

هي مهينو گذريل سال رکيل ڪڪڙين جو تقريباً آخري مهينو هوندو آهي. ڪڪڙين جي چاڻي جاري رکڻو ۽ بيضا نه ڏيڻ وارين ڪڪڙين کي وڪرو ڪريو.

چوڙن کي برسات، آس، گرمي وغيره کان بچائڻ جو ضروري انتظام جاري رکڻو.

گذريل مهينن مطابق ڪمرن جي اڳيان پردا يا چڪ لڳل

رهڻ ڏيو ۽ ڏينهن ۾ ٽي چار دفعا پاڻي ضرور تبديل ڪريو. چوڙن جي سارسنيال گذريل نموني ڪريو ۽ مختلف بيمارين کان بچاءُ لاءِ ويجهي جانورن جي اسپتال سان رجوع ڪريو.

سيپٽمبر

هن مهيني جي موسم ڳوٺاڻي ڪڪڙين جي پالنا شروع ڪرڻ لاءِ بهترين آهي. تنهنڪري هي مهينو ڪڪڙين جي پالنا جي لاءِ نئي سال جو آغاز چورائيندو آهي. آري جي ڪڪڙي يا مشين کان بچا ڪڍائڻ جي لاءِ پهرين سيپٽمبر کان ئي ڪڪڙين ۾ چڏيا وڃن ته جيئن هن مهيني جي وچ ڌاري چوڙا ڪڍائڻ لاءِ سٺا بيضا حاصل ٿي سگهن ٿا. سٺي نسل جي ڇهين ڪڪڙين لاءِ هڪ ڪڪڙ ڪافي هوندو آهي. موسم ۾ تبديلي جي ڪري هن مهيني موت جي شرح تمام گهٽ هوندي آهي. چوڙن کي راڻي ڪيٽ جو ٽڪو ضرور لڳرايو. بيمار چوڙن کي تندرست چوڙن کان الڳ ڪريو. برودر جي ذريعي پاليل چوڙن جو گرمي جو درجو پهرين هفتي 95 رڪو هر هفتي پنج درجا گهٽ ڪندا جو پنجين يا ڇهين هفتي کانپوءِ گرمي جو درجو 70 ٿي وڃي.

آڪٽوبر

هن مهيني ۾ ڪڪڙيون بيضا ڏيڻ شروع ڪري ڏين ٿيون تنهنڪري فارم ۾ ضرورت جي مطابق بيضن لاءِ دٻا رکڻ ۽ ان ۾ ٻورو وغيره وجهو ته جيئن بيضا تٽڻ کان بچي پون انهي کانسواءِ ڪمزور ڪڪڙ ۽ ڪڪڙيون ڪڍي ڇڏيو ٻاهران ڪابه شيءِ ايتري قدر جو ڪوبه شخص به فارم جي پنڊال ۾ داخل نه ٿئي. ڇاڪاڻ ته انهي مان وڇڙندڙ بيماري پڪڙجڻ جو خطرو هوندو آهي. نون ڄاول چوزن جي لاءِ گرمي جو درجو معمول مطابق ساڳيو رکڻ ۽ ڏينهن ۾ به ٽي دفعا نوٽ ڪندا ڪريو.

بروڊر جي چوڌاري جاري لڳايو ته جيئن چوزا ٻاهر نه وڃي سگهن. روز بروز چوزن جي لاءِ جاءِ وڌائيندا رهو. اٺن هفتن کانپوءِ چوزن کي چمڙي جي بخار جو ٽڪو لڳايو. چوزن کي هڪ ٻئي کي چنهنب هڻڻ کان بچائڻ لاءِ انهن جي مٿئين چنهنب مشين (ڊري ڊيڪر) سان کڻي ڇڏيو. برسات جي موسم کانپوءِ ڪڪڙين کي ايندڙ ٽڌي موسم کان بچائڻ لاءِ فارم جي ضرورت مرمت ڪرايو.

نومبر

اسان وٽ هن مهيني ۾ سيءُ پوڻ شروع ٿين ٿا. پکين ۾ سيءُ جي ڪري دائمي ڪنگهه يا وبائي زڪام جون نشانيون ظاهر ٿيڻ شروع ٿي وڃن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾ بيمار پکين جو مناسب علاج ڊاڪٽر جي مشوري سان ڪريو. وڏن چوزن کي وڏن ۽ هوادار ڪمرن ۾ منتقل ڪريو. ننڍن چوزن کي بروڊر جي هيٺيان مناسب گرمي جو درجو ڏيو. بيمار ۽ سست چوزن کي الڳ رکڻ پکين ۾ خوراڪ جي تبديلي آهستي آهستي ڪريو.

سيپٽمبر، آڪٽوبر جا نڪتل چوزا ڪافي تيز ۽ چست هوندا آهن. انهن کي مختلف بيمارين کان بچاءُ لاءِ حفاظتي ٽڪا ضرور لڳرايو. ڄاريدار جهنگلن جي مرمت ڪرايو. فرش گهم وارو نه هجي، خشڪ ٻورو وڇايو وڃي، صفائي جو خاص خيال رکڻو.

هر روز چوزن ۽ فارم جو معائنو ضرور ڪريو.

ڊسمبر

هي انتهائي ٿڌو مهينو هوندو آهي ۽ قدرتي ڳالهه آهي ته ڪڪڙيون تمام جلد متاثر ٿين ٿيون. تنهنڪري سيءُ جي

زهري زباني

وڏا ماڇيون جي غريب رن زال آهيان، منهنجو تعلق غريب گهراڻي سان آهي. ننڍپڻ ۾ منهنجو رشتو منهنجي مائٽن پنهنجي عزيز سان ڪرايو، بدقسمتي چئجي يا رب جي رضا، اسان کي ڪوبه اولاد ڪونه ٿي سگهيو، هڪ دفعي منهنجو مڙس عبدالعزيز ڳوٺ کان بس وسيلي خيرپور وڃي رهيو هيو ۽ بس خيرپور جي پل کان جڏهن گذري ته سڌو وڃي روهڙي ڪئنال ۾ ڪري. ان بس جا 19 مسافر فوت ٿي ويا. جنهن ۾ منهنجو مڙس به شامل هيو. ان خبر منهنجي مستقبل کي تاريخ ڪري ڇڏيو. انءُ بي سهارا ٿي ويو. عبدالعزيز روز ڪمائي ايندو هيو ته گهر جي چلهر ٻرندي هئي، هينئر اها چلهر ٻرڻ بند ٿي وئي. مت مائٽ به آخر ڪيتري مدد ڪن، هلندي هلندي انهن به منهن ڦيري ڇڏيو. پاڙي وارن کان خير خيرات جي ماني تي گذر ٿيندو هيو.

هڪ دفعي سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن وارا اسان جي ڳوٺ ۾ آيا، انهن جي گڏجاڻي ۾ مان به شامل ٿيم، مون بي واه لاءِ روشني جو ڪرڻو ٿي سروس وارا اڀريا.

ڪري بيضن ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي. جڏهن ته هن مهيني ۾ بيضن جي گهرج وڌي ويندي آهي. تنهنڪري ضروري آهي ته موسم جي شدت جي مطابق فارم ۾ گرمي جو درجو 80 تائين قائم رکيو وڃي. وڌيڪ بيضن لاءِ سني ۽ متوازن خوراڪ ڏيو.

ڪڪڙيون جڳهه جي مطابق رکو ته جيئن انهن کي ڪائڻ پيئڻ ۾ تڪليف نه ٿئي بيضا ڏيڻ واري ڪڪڙي جي جسامت مطابق 2 کان 3 چورس فوٽ گوشت وارين پکين کي چورس فوٽ جڳهه فراهم ڪرڻ گهرجي.

سمل جي سياڻپ

مسمات سمل رتوديرو تعلقو لاڙڪاڻه جي همت پري عورت آهي، جنهن همت ڪندي ڊي.سي لاڙڪاڻو کي کليل ڪچهري ۾ درخواست ڏيندي لينڊليس هاري پراجيڪٽ تحت زمين حاصل ڪئي، پاڻ غريب ته هئي پر همت ڪڏهن به ڪونه هاريائين ۽ اهڙو اتساهه ٻين عورتن کي به ڏيندي رهي.

زمين حاصل ڪرڻ کانپوءِ سروسو جي عملي سان لهه وچڙ ڪندي پنهنجي زمين آباد ڪرايائين. سروسو جي عملي کيس چئن ايڪڙن تي بچ پاڻ ته ڏنو پر ليمن، انبن ۽ ڪجين جي ٻوٽن سان گڏوگڏ کيس روزانو آنا ڏيندڙ 12 مرغيون به ڏنيون، جن مان کيس ڏهه آنا روز ملندا رهيا. انهن آڻن کي سمل سياڻي روزانو في آڻو ڏهه روپيه جي حساب سان وڪرو ڪندي هئي. جنهن مان کيس هڪ سو روپيه روزانه ملندا هيا، ۽ مهيني ۾ 3000 هزار روپيه ٿي ويندا هيس. هينئر هو ڪنهن جي اڳيان هٿ ڪونه ٿي تنگي. غريب سمل پنهنجي همت ۽ سياڻپ سبب وڏيري وڏيري سڏجي ٿي. هر ماڻهو کيس عزت جي نظر سان

هنن جي ڳالهين مون تي وڏو اثر ڪيو. مون کي هنن تنظيم ”سچل“ جو ميمبر ڪيو. قرض ڏيڻ وارن جي تيمر مون کي 9000 هزار ڏنا. جنهن مان مون ڪڪڙيون پاليون جيڪي روز آنا ڏينديون هيون. اهي آنا اوڙي پاڙي ۽ ڳوٺ وارن ۾ وڪڻڻ لڳيس ايئن منهنجي آمدني ۾ اضافو ٿيندو ويو.

اڄ مان ننڍو پولٽري فارم گهريلو سطح تي هلايان ٿي، تنظيم سازي جي عمل ڪري مون کي گهڻائي ٻيا فائدا به حاصل ٿيا آهن. جنهن سان دل ۽ دماغ ڪلندي حوصلو ۽ همت وڌي آهي.

اڄ مان ڪنهن کان خيرات جي ماني ڪونه ٿي گهران. بلڪ الله جو شڪر آهي پنهنجي گهر مان خير ڏيان پئي. ۽ پنهنجو گذر سفر ڪندي عزت جي زندگي گهاريان ٿي.



ڏسي ٿو. هاڻ هوءَ بين عورتن جي پڻ رهبري ۽ رهنمائي
 ڪندي کين تنظيم سازي جي مالها ۾ مڙهيو آهي، سي
 سڀ هيٺ ترقي طرف قدم رکندي معاشري ۾ پنهنجي
 حصي جو ڪردار ادا ڪندي سٺي ۽ باعزت زندگي گذاري
 رهيون آهن.



ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ

67

ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ

سني صلاح

ٿورو وقت، ٿوري جاء ۽ گهٽ پئسن سان ڪڪڙين کي پاليو ۽ گهر ويٺي پنهنجي ۽ پنهنجي خاندان کي سني خوراڪ ۽ سني صحت ڏيو ۽ دولت به ڪمايو.

ضروري معلومات

هڪ ڪڪڙ پالڻ لاءِ هلڪي نسل لاءِ 3 چورس فوٽ ڳري نسل لاءِ 4 چورس فوٽ چوزن لاءِ اڌ چورس فوٽ ايراضي جي ضرورت آهي.

سفيد نسل واري ڪڪڙ ڳوٺاڻي ماحول ۾ 140 بيضا ڏيندي آهي. سفيد نسل واري ڪڪڙ جي بيضي جو وزن 36 گرام هوندو آهي.

هڪ نر ڪڪڙ ڏهن ڪڪڙين جي ڦرڻ لاءِ گهرجي. في ڪڪڙ کي روزانه 93 گرام خوراڪ گهرجي. بيضا حاصل ڪرڻ لاءِ مناسب گرمي جو درجو 50 کان 80 ڊگري فارنهایت ڪپي.

بيضا ڏيندڙ ڪڪڙ ڏيڍ سال 72 هفتن لاءِ 50 ڪلوگرام هڪ ٻوري خوراڪ گهرجي.

هڪ سو ڪڪڙيون روزانو 270 لٽر پاڻي پيئنديون.





ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا ڳر



ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا ڳر



ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ



ڪڪڙيون پالي ڪمائڻ جا گڙ